

优质护理对小儿静脉输液穿刺成功率和家长满意度的影响

孙慕飞

(河南省中医药研究院附属医院, 河南 郑州 450004)

【摘要】目的: 探究优质护理对小儿静脉输液穿刺成功率以及家属满意度的影响。方法: 此文选取 100 例儿科科室行静脉输液的病患, 输液时间为 2020 年 1 月-2021 年 1 月, 参考护理模式差异进行分组。对照组 50 例行常规护理, 实验组 50 例在常规基础上接受优质护理。以一次穿刺成功率、家长满意度为观察指标。结果: 对照组与实验组一次穿刺成功率为 82%、96%, 满意度分别为 80%、96%, 实验组均高于对照组 ($P < 0.05$)。结论: 优质护理的实施, 可提高小儿静脉输液穿刺成功率, 也可提高家长满意度, 因此应用价值高。

【关键词】优质护理; 小儿静脉输液; 穿刺成功率; 家长满意度

输液是治疗多种儿科疾病的有力手段, 因为小儿输液工作中, 服务对象均为年龄较小的儿童, 儿童表达主观感受的能力有限, 且有着较差的独立性, 对家长依赖性强。因此在此类患儿的护理工作中, 不仅要考虑对疾病的改善效果, 还应考虑患儿心理、精神以及家属的需求。随着我国医疗护理模式的创新, 优质护理逐渐被应用于临床儿科输液护理工作中, 已经成为一种重要的护理措施。为探究优质护理对输液患儿的护理效果, 本文纳入 100 例患儿展开研究, 现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

此文选取 100 例儿科科室行静脉输液的病患, 输液时间为 2020 年 1 月-2021 年 1 月, 参考护理模式差异进行分组。对照组内, 包括男病患 25 位, 女病患 25 位, 均处于 1~11 岁年龄阶段, 平均值为 (6.29 ± 1.93) 岁。实验组内, 包括男病患 26 例, 女病患 24 例, 均处于 1~11 岁年龄阶段, 平均值为 (6.48 ± 2.01) 岁。此研究未违反伦理委员会要求, 患儿对研究详情知晓, 对照与实验两组病患一般资料不具有统计学差异 ($P > 0.05$)。

1.2 方法

对照组接受常规护理, 常规对患儿进行穿刺, 输液过程中加强巡视, 讲解注意事项等。实验组在上述基础上接受优质护理。
①穿刺前。评估患儿病情、意识、血管状况、穿刺处皮肤状况、药物情况等, 向家属讲解用药情况, 包括输液耗时、输液注意事项等, 在家属干预下为患儿做好心理建设, 主动询问患儿与家长需求, 耐心解答疑惑, 合理指导饮食, 降低胃肠道反应风险。
②穿刺中。护理人员需加强穿刺练习, 提高自身穿刺技术, 同时在家属干预下安抚患儿情绪, 必要时要求家属制动患儿肢体, 避免因患儿挣扎影响穿刺。输液时加强巡视, 密切注意有无不良情况, 若有需及时处理。输液时需做好穿刺针的固定, 叮嘱家属时刻注意患儿穿刺部位, 避免患儿动作幅度过大、抓挠穿刺处。
③输液后。指导家属按压穿刺处, 确认无出血后可离院, 叮嘱注意事项。

1.3 观察指标

以一次穿刺成功率、家长满意度为观察指标。

护理满意度: 以本科室自行编制调查表评价, 包括关于护理

情况的问题 20 个, 每题 0-5 分, 总分值 0-100 分, 根据评分分为满意 (85-100 分)、较满意 (60-84 分)、不满意 (< 60 分) 三个标准。

1.4 统计学处理

将“1.3”中数据进行统计学处理, 处理软件为 SPSS21.0, 在检验表中分别进行卡方检验 (计数资料 (%)) 和 T 值检验 (计量资料 ($\bar{x} \pm s$)), 最终结果以 P 值表示, P 区间在 0.05 以下时, 则表示两组差异明显。

2 结果

对照组与实验组一次穿刺成功率为 82%、96%, 满意度分别为 80%、96%, 实验组均高于对照组 ($P < 0.05$)。详见表 1。

表 1 一次穿刺成功率及满意度比较

组别	满意	较满意	不满意	总计	一次穿刺成功率
对照组	23 (46%)	17 (34%)	10 (20%)	40 (80%)	41 (82%)
实验组	27 (54%)	21 (42%)	2 (4%)	48 (96%)	48 (96%)
χ^2				6.0606	5.0051
P				0.014	0.025

3 讨论

小儿输液的护理服务对象具有特殊性, 由于患儿年龄较小, 适应外界环境的能力有限, 并且患儿多为独生子女, 因此大多数患儿的承受能力较低, 对家长有极强的依赖性, 增加了儿科输液护理工作的难度。且多种儿科疾病特点为起病急, 且病情变化快, 治疗效果受患儿依从性影响较大, 因此增加了各种不良事件的发生风险。既往的护理方法, 主要针对患儿的疾病改善以及治疗安全性, 对患儿的心理健康注意力不足, 严重影响了患儿对治疗及护理的依从性, 也影响了患儿的治疗效果。优质护理工作中融入了人文关怀的理念, 根据患儿的个人特点、病情展开针对性的干预, 通过穿此前的健康教育提高了家属配合度, 穿刺时安抚患儿情绪, 同时通过护理人员穿刺技术的提高, 有效提高了穿刺成功率, 穿刺后注意事项的讲解及穿刺处按压的指导, 进一步提高了家长的满意度。

综上所述, 优质护理的实施, 可提高小儿静脉输液穿刺成功率, 也可提高家长满意度, 因此应用价值高。

参考文献:

[1] 汤学梅. 优质护理干预对提高小儿静脉输液穿刺成功率和家长满意度的影响研究 [J]. 世界最新医学信息文摘, 2017, 17(66): 24-25.

上接第 199 页

评分高于对照组 ($P < 0.05$)。说明在老年股骨粗隆间骨折疾病护理中应用自我效能理论联合渐进式功能锻炼方法具有可行性, 给予了患者科学的锻炼指导, 使康复锻炼的有效性及其正确性得以显著提升。

综上所述, 在老年股骨粗隆间骨折疾病护理中应用自我效

能理论联合渐进式功能锻炼展现出了较高的临床应用价值, 提升了患者自我效能及髋关节功能。

参考文献:

[1] 韩玲燕. 自我效能理论联合渐进式功能锻炼在老年股骨粗隆间骨折患者护理中的应用价值 [J]. 河南医学研究, 2020, 29(07)